



Maxforce®
WHITE IC


INSECTICIDA • INSETICIDA

- ✓ Cebo en gel para programas de mantenimiento.
- ✓ Eliminación segura y duradera.
- ✓ Isco sob a forma de gel para programas de manutenção.
- ✓ Eliminação segura e duradoura.

Composição: Imidacloprid 2,217%
Registrado en el R.O.B con el n° – ES/MR(NA)-2019-18-00595
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO PROFESIONAL

Composição: Imidaclopride 2,217%
Autorização de Venda
n° PT/DGS mrp-116/2019 da D.G.S.
MANTER FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS
USO PROFISSIONAL

4 x 30 g e



ES



Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Contiene 1,2-Benzisotiazolin-3-ona (BIT). Puede provocar una reacción alérgica.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Recoger el vertido.
Eliminense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso, de acuerdo con la normativa vigente.

ATENCIÓN

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
Teléfono 91 562 04 20

PT



Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Contém 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-ona (BIT). Pode provocar uma reação alérgica.
Evitar a libertação para o ambiente.
Recolher o produto derramado.
Eliminar o recipiente em centro de reciclagem de resíduos domésticos.
Eliminar o conteúdo em centro de reciclagem de resíduos domésticos.

ATENÇÃO

EM CASO DE INTOXICAÇÃO LIGAR PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: CIAV – Tel. 800 250 250

Nº de Lote y fecha de fabricación: ver marcaje en el envase
Fecha de caducidad – 2 años después de la fecha de fabricación

Inscrito y Distribuido por: Bayer CropScience, S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3 - 5 - 08970 Sant Joan Despí
(Barcelona) - Tel. 932 284 000
© Marca Registrada de Bayer

Lote e Data de fabrico: ver embalagem
Prazo de validade - 2 anos após a data de fabricação marcada

Registado e distribuido por: Bayer CropScience (Portugal), Produtos para a Agricultura, Lda.
R. Quinta do Pinheiro, 5 - 2794-003 Carnaxide
Telef.: 21 417 21 21 - www.cropscience.bayer.pt
© Marca Registrada de Bayer



Ed.0220 - POS86799596A - ARTICLE 86747936

Bayer

Maxforce White IC é uma formulação de isco pronto a usar, para combater diferentes tipos de baratas: barata alemã (*Blatella germânica*), barata oriental (*Blatta orientalis*), barata australiana (*Supella germânica*) e barata americana (*Periplaneta americana*) em adultos e ninfas.

Utiliza-se para controlo em espaços interiores, para ser utilizado em instalações industriais e comerciais, em áreas domésticas e privadas e edifícios públicos (ex: hospitais, lares de idosos, etc).

Uso profissional.

Instruções específicas de utilização:

O produto é aplicado utilizando um aplicador de gel apropriado. Quando o tratamento terminar, remova o cartucho vazio e elimine-o em segurança. Se o cartucho for apenas parcialmente usado, remova-o do aplicador, feche-o com a tampa fornecida e armazene de acordo com as instruções.

Doses e métodos de aplicação:

Aplicar o **Maxforce White IC**, na forma de gotas ou riscas nas superfícies das áreas-alvo identificadas. Pode ser aplicado em cantos, ranhuras e fendas e cavidades.

A taxa de aplicação depende do tamanho da infestação.

Uma gota = 0,1 g (aproximadamente 7 mm de diâmetro).

Em alternativa, é possível aplicar uma risca com quantidade equivalente a 1 gota.

Taxa de aplicação para densidade de infestação indicada* por m² é aseguinte:

Espécie de barata	Dose baixa	Dose alta
Pequena: • Barata germânica • Barata australiana	1 gota x 0,1 g	2 gotas x 0,1 g
Grande: • Barata oriental • Barata americana	2 gotas x 0,1 g	3 gotas x 0,1 g

* Taxa máxima de aplicação de 3 x 0,1 g gotas por metro quadrado, com o máximo de repetições de 3 – 11 vezes por ano, por edifício, não devem ser excedidas as taxas máximas de:

- 60 gotas x 0,1 g (ou seja, 6 g de isco) de uma seringa com 30 g numa casa de habitação;
- 270 gotas x 0,1 g (ou seja, 27 g de isco) de uma seringa com 30 g num edifício de grande dimensão.

No caso de ser necessário aplicar uma maior quantidade de isco no interior, deve ser utilizada uma estação de isco.

Os resultados da aplicação deste produto, são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

Instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Geral:

- Abandonar a área de perigo. Colocar e transportar a vítima em posição estável (deitada de lado). Despir as roupas contaminadas imediatamente e eliminar de forma segura.

Ingestão:

- Lavar a boca com água. Contactar um especialista no tratamento de envenenamento. Consultar imediatamente um médico se ocorrerem sintomas e/ou forem ingeridas grandes quantidades. No caso de falta de consciência, colocar a vítima numa posição de recuperação e consultar imediatamente um médico. Não administrar líquidos nem provocar o vômito.
- Manter o recipiente ou rótulo disponível. Se necessário, levar a pessoa ao hospital e mostrar o rótulo ou a embalagem. Não deixar a pessoa envenenada sozinha.

Contato com a pele:

- Despir o vestuário e calçado contaminado. Lavar a pele contaminada com água e sabão. Se ocorrerem sintomas, contactar um especialista no tratamento de envenenamento. Procurar um médico se a irritação se desenvolver e persistir.

Contato com os olhos:

- Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante, pelo menos, 15 minutos. Não se esquecer de remover lentes de contacto.

Instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem:

- Não derramar o produto não utilizado no chão, em cursos de água, na canalização (lava-louça, sanita, etc.) ou no esgoto.

Medidas de mitigação do risco específicas:

APENAS PARA USO COMO INSETICIDA.

APENAS PARA USO POR UTILIZADORES PROFISSIONAIS.

Não aplicar diretamente em superfícies em que a comida ou os alimentos para animais sejam guardados, preparados ou ingeridos.

Utilize apenas em locais inacessíveis a crianças e animais.

Impedir que crianças e animais acedam ao isco.

Lavar as mãos e a pele exposta antes as refeições e após a utilização.

Este material e a sua embalagem têm de ser eliminados de modo seguro.

Apenas para uso em interiores.

Perigoso para as abelhas.

Não derramar o produto não utilizado no chão, em cursos de água, na canalização (lava-louça, sanita, etc.) ou no esgoto.

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções fornecidas.

Não aplicar em áreas sujeitas a limpeza húmida de rotina.

Remover os resíduos de isco endurecidos com uma esponja ou um pano húmido. A totalidade do isco e os materiais utilizados

- Proteger do gelo.
- Armazenar em local protegido da luz.

(esponja, pano, etc.) devem ser eliminados em segurança como lixo doméstico.

Não utilizar o produto em áreas onde haja a suspeita de haver resistência à(s) substância(s) ativa(s).

No caso de reinfestação, reaplicar o produto sem exceder o número máximo de tratamentos autorizados por ano.

Informar o titular do registo se o tratamento não for eficaz.

Antes do tratamento, remover todas as fontes de alimento para as baratas (resíduos, restos alimentares, etc.) da área infestada para encorajar a ingestão do gel.

Não aplicar o produto em superfícies absorventes.

Não expor as gotas de isco à luz solar ou ao calor (ex: radiador)

Evitar a utilização contínua do produto.

Utilizar apenas em áreas escondidas de acesso difícil e afastadas de água, tais como fendas e ranhuras.

Alternar **Maxforce White IC** com a utilização de produtos contendo as substâncias ativas com um modo de ação diferente.

Adotar métodos integrados de controlo de pragas, tais como a combinação de métodos químicos e físicos e outras medidas de saúde pública, tendo em conta as características do local (condições ambientais, espécies-alvo, condições de utilização, etc).

Condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento:

- Armazenar na embalagem original.
- Armazenar num local fresco, seco e bem ventilado.