Racumin® FOAM

RATICIDA

✓ Raticida de contacto contra ratas y ratones *(Rattus norvegicus y Mus musculus)*

Espuma en aerosol (AE)

Composición: Cumatetralilo 0,4062 %
Isotridecanol etoxilado 1,8 %

Registro en el R.O.B.
nº ES/MR(NA)-2018-14-00358

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta

Contacto e ingestión

℮ 650
500 ml ℮
(450 g de solución y
41 g de propelente)

PELIGRO

Aerosol extremadamente inflamable.
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Provoca irritación ocular grave.
Puede dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos (sangre), tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Solicitar instrucciones especiales de uso.
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
No respirar los vapores/el aerosol.
Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.
Guardar bajo llave.
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50º C/122º F.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Recoger el vertido.
Elimínese el contenido y/o su recipiente, así como los roedores muertos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Racumin Foam es un rodenticida en formulación en aerosol que libera su contenido en forma de espuma. Es un producto anticoagulante para el control de ratas y ratones en interior de edificaciones para protección de la salud y de materiales (por ejemplo, líneas o tuberías de cable cerradas, subestructuras de, p. Ej., armarios eléctricos o armarios de alta tensión, cavidades en paredes y revestimientos de paredes, entradas en orificios para ratas, aberturas de pared, pasajes estrechos, falsos techos, paredes aislantes, pozos de servicio, instalación ejes, travesaño de estructuras de andamios). Los roedores ingieren el producto tras limpiarse después de entrar en contacto con la espuma. Racumin Foam se usará bajo circunstancias excepcionales si otras formas de control químico o cebos convencionales no han sido efectivas.
El producto contiene un agente amargante y un colorante.

Autorizado para:
Control de ratas y ratones por personal profesional especializado.

ES85402080C - Ed.0618 - *ARTICLE 85416294*

CONTIENE / INCLUYE Bitrex

Bayer

Bitrex es una marca registrada de MacFarlan Smith, Edinburgh

Lote y fecha de fabricación: ver envase
Fecha de caducidad: 4 años después de la fecha de fabricación.

Registrado y distribuido por
Bayer CropScience S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 Paterna (Valencia)
España
Teléfono: 96 196 53 00
www.environmentalscience.bayer.es

INFORMACIÓN

Racumin® FOAM

Instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Primeros auxilios

Este producto contiene una sustancia anticoagulante.

En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces y orina.

Antídoto: Vitamina K_1 administrada solo por personal médico / veterinario.

En caso de:

- Exposición dermal, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.
- Exposición ocular, compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retírelas, enjuagar los ojos con agua o líquido para enjuagar los ojos, mantener los ojos abiertos durante al menos 10 minutos.
- Exposición oral, enjuague la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provoque el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono: 91 596 04 20). Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.

Cuando la espuma se coloque cerca de sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua.

Peligroso para fauna salvaje.

Medidas de Mitigación del riesgo

Generales:

- Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes (ej: usuarios del área tratada o sus alrededores) sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas, si los hay).
- No utilizar en áreas donde se sospeche que existe resistencia a la sustancia activa.
- Los productos no deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento.
- No alternar el uso de diferentes sustancias activas anticoagulantes con potencias comparables o menores con el propósito de gestionar las resistencias. Si se alternan, considerar el uso de rodenticidas no anticoagulantes, si existen, o un rodenticida anticoagulante más potente.
- No lavar los utensilios utilizados en los puntos de cebo con agua entre aplicaciones.
- Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración.
- No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para monitorizar la actividad de roedores.
- No utilizar el producto en tratamientos de cebado por pulsos.
- Este producto solo se usará en circunstancias excepcionales si formulaciones no químicas o cebos convencionales no han sido efectivos.
- Este producto en espuma solo se usará en interior y en lugares no accesibles para niños ni animales no objeto (por ejemplo: tuberías o líneas de cable cerradas, subestructuras de, por ejemplo, cuadros eléctricos o de alto voltaje, cavidades en paredes y revestimientos de paredes).
- Las áreas tratadas en los edificios deben estar aseguradas para evitar el acceso de niños y mascotas.
- Para evitar residuos en alimentos y alimentos para animales cuando se utilice el producto biocida, mantenga una distancia de al menos 2 metros a lugares donde se almacenen, preparen e ingieran alimentos y alimentos para animales.
- Antes de las medidas de control de roedores, todos los usuarios de las instalaciones, edificios y sus alrededores donde se coloque la espuma, tienen que estar informados sobre los riesgos para los humanos, las mascotas y los animales salvajes. También deben estar informados sobre las medidas en caso de intoxicación, mala aplicación de la espuma o el hallazgo de roedores muertos (de acuerdo con la etiqueta del producto).

Específicas del uso:

- Aplicar medidas de control preventivas (ej: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión.
- Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas.
- Este producto solo se usará en interior y en lugares no accesibles para niños ni animales no objetivo.

Modo de empleo

Antes de usar Racumin Foam lea y siga la información del producto así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo.

Instrucciones de uso:

- Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación *in situ* para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación.
- Se recomiendan 2 aplicaciones por tratamiento.
- Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej. grano suelto o residuos de alimentos). A parte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más fácil de alcanzar.
- El producto debe ser usado como parte del plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control.
- El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras…)
- Cuando el producto se utiliza en zonas públicas, las zonas tratadas deben marcarse durante el período de

INFORMACIÓN

tratamiento y una señal explicativa debe informar sobre el riesgo de envenenamiento primario y secundario por los anticoagulantes, así como las medidas de primeros auxilios.

- Colocar el producto fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales no objetivo (por ejemplo, líneas de cable o tuberías cerradas, subestructuras de, por ejemplo, cuadros eléctricos o de alto voltaje, cavidades en paredes, revestimientos de paredes, entradas a agujeros de ratas, aberturas de pared, pasos estrechos, falsos techos, paredes aislantes, acometidas, pozos, travesaño de andamios).
- El agujero no debe llenarse completamente con la espuma para que los animales continúen reconociendo los pasajes y caminos habituales. Si se llena el agujero completamente, los animales pueden dudar en pasar.
- La cantidad de puntos de tratamiento depende del diseño de los locales o del edificio.
- No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.
- Use guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación (el material del guante debe ser proporcionado por el titular de la autorización dentro de la información del producto.
- Es obligatorio el uso de máscara o gafas protectoras durante la manipulación del producto.
- Durante el uso del producto no comer, beber o fumar.
- Lavar las manos y áreas de la piel expuestas después de utilizar el producto.
- Retirar el producto sobrante al final del tratamiento.

Método y dosis de aplicación

Antes de aplicar Racumin Foam, verifique que el envase se encuentra a la temperatura ambiente.

Agitar el bote aerosol hasta oír la bola en el interior.

Aplicar presionando la válvula del aerosol, dirigiendo la espuma a la parte del local de aplicación.

Preferentemente se colocará a la salida de los escondites y madrigueras, en los huecos de las construcciones y/o caminos utilizados habitualmente por los roedores, en locales inaccesibles a niños, mascotas y otros animales.

Dosis de aplicación:

Ratas: 20 a 30 g de espuma (bola con 11 cm de diámetro), dependiendo del grado de infestación.

Ratones: 4 a 30 g (6-11 cm de diámetro), dependiendo del grado de infestación.

Aplicar las cantidades indicadas por local de tratamiento. Dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, la espuma persiste entre 7 a 12 días después de aplicada.

Debido a su modo de acción retardado, los raticidas anticoagulantes pueden tomar de 4 a 10 días para ser efectivos después del consumo efectivo del producto.

Limpieza:

- No lave los utensilios utilizados en el tratamiento con agua entre aplicaciones.
- Deseche los roedores muertos de acuerdo con los requisitos locales.
- Después de la finalización de la medida de control de plagas, recolecte el producto residual en el sitio usando toallas secas.

Seguimiento del tratamiento- Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

- La frecuencia de las visitas a las áreas tratadas debe ser a criterio del aplicador, en virtud de las encuestas realizadas al comienzo del tratamiento. Esa frecuencia debe ser consistente con las recomendaciones proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.
- Si después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa.
- Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida no anticoagulante o un rodenticida anticoagulante más potente. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa.
- Al final del tratamiento elimínense el cebo no consumido a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
- Los roedores son transmisores de enfermedades. No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilice guantes o utensilios tales como pinzas para su eliminación.
- Evite el contacto con la piel al desechar los restos de la espuma.
- Se recomienda como método de tratamiento la incineración.
- Al final del tratamiento elimínense las toallitas de limpieza a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Almacenamiento

- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
- Mantener el envase cerrado y alejado de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja.

Advertencias al Usuario: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

INFORMACION