

## Descripción de producto

**Habistro® Gel** es una formulación de cebo con gel insecticida de uso profesional listo para usar y controlar diferentes tipos de cucarachas y lepidos (pececillo de plata).

Contiene el ingrediente activo Clotianidina al 1,00% e incluye en su formulación de gel un conjunto de ingredientes alimenticios sumamente atractivos para las cucarachas y para las ninfas en particular. **Habistro® Gel** contiene igualmente un agente de sabor amargo para evitar ingestiones accidentales.

## Espectro de acción

### RASTREROS

Cucarachas multiespecie (adultos y ninfas):

// Cucaracha germánica o alemana (*Blattella germanica*).

// Cucaracha común, oriental o negra (*Blatta orientalis*). // Cucaracha americana o roja (*Periplaneta americana*). // Lepisma (pececillo de plata) (*Lepisma saccharinum*).



Cucaracha alemana



Cucaracha oriental



Cucaracha americana



Pececillo de plata

## Peligro y prudencia



ATENCIÓN

### INDICACIONES DE PELIGRO

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

EUH208 Contiene 1,2-bencisotiazolin-3-ona y 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-ona/2-metil-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

### CONSEJOS DE PRUDENCIA

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

## Escenarios de utilización

- // Edificios industriales y comercios.
- // Áreas domésticas/privadas.
- // Edificios públicos (p.e. colegios, hospitales, residencias asistidas).

## Datos

**Registro:** ES/MR(NA)-2019-18-00658.

**Composición:** Clotianidina 1% (grado puro) 1,026% (grado técnico).

**Formulación:** Cebo insecticida en gel – listo para su uso (RB).

**Presentación:** Jeringa aplicadora de 20 g.

**Periodo de estabilidad del producto:** 2 años.

## Equipo de protección



**Protección manos:** Guantes de protección cumpliendo con la directiva EN 374:

- Material: Caucho nitrilo.
- Tasa de permeabilidad: > 480 min.
- Espesor del guante: > 0,4 mm.



**Protección de los ojos:** Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).



**Protección piel y cuerpo:** Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6.



**Habistro® Gel**  
Cucarachas

Ficha técnica



## Dosis y usos autorizados

| Ámbito de utilización | Método de aplicación                                     | Categoría de usuario | Plazo de reentrada |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| INTERIORES            | Localizada en forma de gota.<br>Con jeringa dosificadora | Profesional          | No requiere        |

| Espectro de acción                                      | Dosis infestación moderada<br>(raramente se ven cucarachas durante el día)           | Dosis infestación intensa<br>(suelen verse cucarachas durante el día) | Frecuencia                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cucaracha pequeña<br>(rubia o alemana ninfas y adultas) | 0,1 g/m <sup>2</sup> (1 punto x 0,1 g)                                               | 0,2 g/m <sup>2</sup> (2 puntos x 0,1 g)                               | No aplicar<br>más de una vez<br>al mes |
| Cucaracha grande<br>(negra u oriental ninfas y adultas) | 0,2 g/m <sup>2</sup> (2 puntos x 0,1 g)                                              |                                                                       |                                        |
| Cucaracha roja o americana<br>(ninfas y adultas)        | 0,2 g/m <sup>2</sup> (2 puntos 0,1 g)<br>0,3 g/m <sup>2</sup> (2 o 3 puntos x 0,1 g) |                                                                       |                                        |
| Lepismas                                                | 0,1422 g/m <sup>2</sup>                                                              |                                                                       |                                        |

**Relación diámetro/peso de las gotas:** - una gota de 7 mm  $\approx$  0.1 g - una gota de 3 mm  $\approx$  0.007 g - una gota de 2 mm  $\approx$  0.002 g

## Instrucciones de uso

**Habitro® Gel** se presenta con una jeringa aplicadora lista para su uso.

Antes del tratamiento, los usuarios deben estudiar el área que se va a tratar para identificar lugares de infestación de cucarachas y lepismas.

El cebo se aplica en lugares disimulados, como son cantos, bordes, rendijas, agujeros, etc, y siempre lo más cerca posible de los refugios.

Deben eliminarse del área infestada todas las fuentes naturales de alimentos apetecibles para las cucarachas para favorecer la ingestión del cebo.

Cabe esperar un efecto muy rápido sobre la población de cucarachas, observándose cucarachas muertas a las 24 horas del tratamiento. Los niveles máximos de control se alcanzan entre seis días y dos meses después del tratamiento según el nivel de infestación y siempre que el gel esté presente. En caso de niveles de infestación altos, examinar los puntos aplicados del producto biocida periódicamente (una vez al mes) y realizar aplicaciones adicionales según proceda. No obstante, no se debe aplicar más de una vez al mes.

### CONTROL DE CUCARACHAS PEQUEÑAS

// Los cebos en gel deben permanecer aplicados al menos 14 días para una eficacia óptima. Un mes después, se pueden volver a aplicar cebos en gel frescos nuevos si siguen viéndose cucarachas.

### CONTROL DE CUCARACHAS GRANDES

// Los cebos en gel deben permanecer aplicados al menos 4 semanas para una eficacia óptima. Si siguen viéndose cucarachas, se pueden volver a aplicar cebos en gel frescos nuevos.

### CONTROL DE LEPISMAS

// Aplicar muchas gotas pequeñas en áreas en las que se ocultan y vivan las lepismas. Estas áreas pueden estar debajo y detrás de rodapiés y zócalos y debajo de revestimientos de madera o de otras áreas que proporcionen cobertura.

// Los cebos en gel deben permanecer aplicados al menos 8 semanas para una eficacia óptima. Si siguen viéndose lepismas, se pueden volver a aplicar cebos en gel frescos nuevos. La dosis de aplicación corresponde a aproximadamente 20 puntos de 3 mm de diámetro por metro cuadrado o 65 gotas de 2 mm de diámetro por metro cuadrado.

## Otras recomendaciones de uso

// No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

// Coloque los puntos de cebo en lugares inaccesibles para niños o mascotas.

// No aplique en superficies donde se almacenan, preparan o comen alimentos o piensos.

// Evite la aplicación en lugares excesivamente polvorientos, húmedos o grasientos, y en superficies sujetas a limpieza húmeda.

// No aplicar sobre superficies absorbentes, No exponer las gotas de cebo a la luz del sol ni a fuentes de calor. Proteger de la lluvia.

// Información: Algunos materiales sensibles, como los tejidos, pueden teñirse con el producto. En caso de duda, aplicar antes en un área pequeña poco visible.

// Gestión de envases: una vez vacío, después de utilizar, el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO. Para más información sobre puntos de recogida visite [www.sigfito.es](http://www.sigfito.es)



**Bayer CropScience, S.L.**  
Environmental Science  
Av. Baix Llobregat, 3 - 5  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
Tel. 93 228 40 40  
[www.es.bayer.es](http://www.es.bayer.es)

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.