Descrição do produto

Inseticida líquido de amplo espectro de ação para diluir em água e aplicar em pulverização superficial, indicado para o tratamento de todos os tipos de insetos rastejantes e moscas quando pousadas. A substancia ativa pertence à familia dos piretróides e confere ao produto um notável efeito de choque e elevada persistencia.

Espectro de ação

RASTEJANTES

// Baratas
// Percevejos
// Pulgas
// Formigas

VOADORES

// Moscas

Barata | Percevejo | Pulga | Mosca

Equipamento de proteção

Proteção das mãos: Luvas de proteção de acordo com EN 374:

- Material: Borracha de nitrilo.
- Velocidade de permeabilidade: > 480 min.
- Espessura das luvas: > 0,4 mm.
- Índice de protecção: Classe 6.

Proteção dos olhos: Usar óculos de proteção (de acordo com EN166, domínio de utilização = 5 ou equivalente).

Proteção da pele e do corpo: Utilizar uma bata standard e fardamento da categoria 3 tipo 6.

Cenários de utilização

Para usar em habitações e em instalações comerciais e industriais. Em edifícios como:

// Casas e blocos de apartamentos
// Hotéis
// Restaurantes
// Hospitais
// Instalações de industrias alimentares
// Armazéns

Dados

Autorização de Venda n.º: PT/DGS mrp 27/2020.

Composição: Deltametrina - (grau puro) - 2,43%, (grau técnico) - 2,47%,

Fórmula: Suspensão concentrada (SC).

Apresentação: Recipientes de 50ml e 250ml. Com tampa de medição.

Período de estabilidade do produto: 2 anos.

Efeito residual: até 3 meses, dependendo da limpeza e natureza da superfície em que foi aplicado.

Perigo e prudência

ATENÇÃO

INDICAÇÕES DE PERIGO

H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH208	Contém 1,2-Benzisotiazolin-3-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P391	Recolher o produto derramado.
P501	Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a regulação local.

Habitro® sc

Ficha técnica

BAYER

Doses e usos autorizados

Âmbito de utilização	Método de aplicação	Categoria de utilizador	Prazo de reintrodução
Interior	**Pulverização**	**Profissional**	**Assim que as superfícies pulverizadas estiverem secas**

Espectro de ação	Descrição da utilização	Taxa de diluição		Dose de aplicação do preparado[1)]	Frequência
		Habitro® SC	Água		
Insetos rastejantes	Controlo das infestações crónicas	50 mL	5 Litros	5 L / 100 m² [1)]	Até um máximo de 11 aplicações por ano
	Controlo de infestações localizadas	25 mL	5 Litros	2,5 L / 100 m² [2)]	
Moscas	Para o controlo de moscas domésticas	50 mL	5 Litros	5 L / 100 m² [1)]	

[1)] A quantidade de princípio ativo aplicado por m² é de (12,5 mg/m²) / [2)] A quantidade de princípio ativo aplicado por m² é de (6,25 mg/m²)

Instruções de utilização

Habitro® SC é aplicado, uma vez dissolvido em água, por pulverização:

1. Agite o producto antes de usar.
2. Meça a quantidade apropriada, de acordo com a taxa de diluição, usando a tampa de medição.
3. Despeje o conteúdo no tanque do pulverizador.

Pulverize os locais frequentados por insetos e as zonas de nidificação. O conhecimento da biologia do inseto facilitará o seu reconhecimento. As doses de diluição e aplicação dependem do tipo de inseto a ser controlado e do tipo de superfície em que o produto é aplicado.

MISTURA E PULVERIZAÇÃO

// Verifique se o pulverizador está limpo. Se necessário, lave o equipamento com água e sabão antes de utilizá-lo e trate a água de lavagem de acordo com os regulamentos nacionais e regionais.

// Encha o pulverizador com metade do volume de água necessário. Abra cuidadosamente a tampa e o selo do recipiente do produto. Meça com exatidão a quantidade necessária de produto e despeje-a cuidadosamente (evitando derramamentos) no reservatório de pulverização. Termine de encher o pulverizador com água até ao nível adequado e agite. Agite novamente o reservatório de pulverização se a aplicação for interrompida por mais de 30 minutos.

// Dilua apenas com água.

// Aplique com um equipamento de pulverização manual ou mecânico capaz de produzir uma pulverização densa, que quase pingue. Para o tratamento de superfícies expostas, use uma boquilha de jato plano. Para pulverizar fendas e ranhuras, utilize uma boquilha de jato fino ou uma extensão especial para fendas e ranhuras. A largura máxima da banda de pulverização é de 0,1 m. Mantenha uma distância adequada entre a boquilha e a superfície tratada para obter a largura de banda desejada.

CONTROLO GERAL DE INSETOS EM EDIFÍCIOS

// Pulverize as juntas da parede/chão, tapetes, etc. bem como fendas e ranhuras nas quais os insetos se possam refugiar. Este produto apenas será aplicado em toda a superfície para tratar tapetes e carpetes. Faça o mesmo que anteriormente, mas aplique em bandas de 0,5 m de largura, sobrepondo-as para garantir uma cobertura uniforme da pulverização.

// **Em zonas que são limpas com água:** Pulverize apenas fendas e ranhuras com uma largura de banda máxima de 0,1 m.

// O efeito residual do depósito durará até 3 meses, dependendo da limpeza e natureza da superfície em que foi aplicado. Podem ser realizadas, no máximo, até 11 aplicações por ano.

// As crianças, os animais de estimação poderão entrar novamente nas instalações tratadas com **Habitro® SC** assim que as superfícies pulverizadas estiverem secas. Recomenda-se ventilar as divisões assim que a pulverização estiver seca e a não limpar a área tratada até que a infestação tenha sido controlada..

// O efeito residual dos produtos de pulverização de superfícies geralmente é reduzido em superfícies porosas; portanto, é recomendável tratar em superfícies não porosas sempre que possível.

CONTROLO DE INSETOS RASTEJANTES, INFESTAÇÕES CRÓNICAS E LOCALIZADA

Utilize as doses de aplicação prescritas na tabela de dosagem.

Para o controlo de insetos rastejantes em zonas que não são limpas com água:

// Pulverize de forma localizada em edifícios, prestando especial atenção a portas, janelas, ranhuras, fendas e outros pontos de entrada habitualmente utilizados pelos insetos.

// Pulverize estrados e colchões, se estiverem infestados, bem como fendas e ranhuras em paredes e pisos adjacentes.

// Pulverize os tapetes infestados, prestando especial atenção aos rebordos e aos tapetes de parede a parede.

// Pulverize espaços ocultos e zonas onde possam procurar comida com especial atenção a ranhuras e fendas e zonas situadas atrás ou por baixo de máquinas, equipamentos de cozinha ou tubagens.

// Pulverize os móveis e os revestimentos do chão infestados.

Para o controlo de insetos rastejantes em zonas que são limpas com água:

// Pulverize apenas como tratamento de fendas e ranhuras, com uma largura de banda máxima de 0,1 m.

Limitações:

// Este produto não se destina ao tratamento de formigueiros.

PARA O CONTROLO DE MOSCAS-DE-CASA (MOSCA DOMÉSTICA)

Utilize as doses de aplicação prescritas na tabela de dosagem.

Para o controlo de moscas em zonas que não são limpas com água:

// Identifique onde as moscas pousam e pulverize a superfície.

Para o controlo de moscas em zonas que são limpas com água:

// Pulverize apenas como tratamento localizado/de fendas e ranhuras, com uma largura de banda máxima de 0,1 m.

Outras recomendações de utilização

// O produto deve ser aplicado de forma que tanto as crianças e animais de estimação, como os alimentos ou rações, não entrem em contacto com o mesmo.

// Não aplique diretamente sobre as superfícies em que os alimentos ou rações são armazenados, preparados ou consumidos.

// Não pulverize sobre roupas de cama ou outros materiais que possam ser lavados.

// Na limpeza posterior ao tratamento, os panos/trapos usados devem ser eliminados juntamente com os resíduos sólidos e não devem ser enxaguados ou lavados após a sua utilização.

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda
Rua Quinta do Pinheiro, nº 5
2794 - 003 Carnaxide
Tel: +351 21 417 21 21
www.es.bayer.pt

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.