

SUOMI KÄYTTÖOHJEET**VAIN AMMATTIHENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN**

Sisäkäyttö: teolliset/kaupalliset toimitilat; kotitaloudet ja yksityiset alueet keittiöt, olohuoneet ja kellarit; julkiset tilat (esim. sairaalat, hoitokodit)

Ulkokäyttö: terassit, kiveykset, kivipihat, vajojen ja autotallien sisääntulot. Julkiset tilat (esim. sairaalat, hoitokodit). Ei saa käyttää maassa, nurmikolla tai kukkapenkeissä.

Vaarallista mehiläisille.

Kohde-eliöt: Sokerimuurahainen, aavemuurahainen (vain sisäkäyttö), faaraomuurahainen (vain sisäkäyttö), argentiinalainen muurahainen.

Sisäkäytössä valmistetta levitetään muurahaisten kulkureiteille, ja ulkokäytössä valmistetta lisätään rakoihin ja koloihin ja muurahaisten kulkureiteille terasseille, kiveyksille, kivipihalle, vajojen ja autotallien sisääntuloihin jne.

Suojaa mehiläiset valmisteelta ja itse valmiste sääoloilta peittämällä valmisteeseen lisäskohta esimerkiksi kukkaruukulla tai laatalla. Varmista, että muurahaisten pääsevät syötinluokse.

Jos pesä sijaitsee kivetyksellä (mukulakivilattia, betoni jne.), valmistetta voidaan levittää myös suoraan pesän sisääntulolle.

Suojaa mehiläiset valmisteelta ja itse valmiste sääoloilta peittämällä valmisteeseen lisäskohta esimerkiksi kukkaruukulla tai laatalla. Kun valmistetta käytetään rakennusten ympärillä, sitä

ei saa kuitenkaan käyttää viemärien lähellä. Jos käsittelystä alueesta on yhteys sadeveden keruuseen tai viemäriin, käytä valmistetta vain alueilla, jotka eivät herkästi jää veden alle tai kastu eli jotka on suojattu sateelta, tulvalta ja puhdistusvedeltä.

Annostelu: Valmisteen käyttäminen

Yksi 200 mg:n pisara (halkaisija 1 cm) neliometriä kohti tai yksi 200 mg:n pisara (halkaisija 1 cm) metrin matkalle muurahaisten kulkureiteille. Kun olet käsittelemässä pesiä, purista 2 grammaa tai 10 pisaraa suoraan pesän sisääntulolle.

Valmistetta levitetään käyttäen sopivaa geelilevitintä.

Levitä valmistetta paikkaan, jossa se ei ole suorassa auringonvalossa tai suoraan lämmönlähteiden vaikutuksen alaisena (älä käytä sitä esim. lämpöpatterin alla).

Älä aseta paikkoihin, joissa valmistetta voi päästä ruokaan, rehuun tai veteen.

Tarkista syöttipisteet kerran viikossa. Vältä valmisteen jatkuvaa käyttöä.

Jos tuholaisongelmaa ei saada torjuttua yhdellä käyttökerralla, valmistetta voi olla tarpeen käyttää uudelleen.

Huomautukset:

- VÄLTÄ HAALAREIDEN LIALLISTA TAHRIUTUMISTA VALMISTEESTA.
- Pese kädet ja paljas iho ennen ateriaa ja käytön jälkeen.
- Estä lasten ja eläinten pääsy syöttien luo.
- Ulkokäytössä levitä tätä biosidivalmistetta vain rakoihin ja koloihin tai suoraan muurahaispesiin.

- Kun käsittely on valmis, poista tyhjä putkilo ja hävitä se turvallisesti.
- Jos putkilo käytetään vain osittain, poista se levittimestä, sulje se mukana toimitetulla tulpalla ja säilytä ohjeiden mukaan.
- Älä saastuta virtoja, jokia tai vesistöjä valmisteella tai käytetyillä valmistepakkauksilla.
- Hävitä tyhjä pakkaus sekajätteenä ja sisältö vaarallisena jätteenä.

Säilytys-suositukset

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Suojaa pakkaselta.

Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa.

Valmiste säilyy käyttökelpoisena enintään 36 kuukautta.

Ensiapu

Ihokosketus: Pese saastunut iho saippualla ja vedellä, huuhtelee sen jälkeen vedellä. Hakeudu lääkäriin, mikäli ihoärsytystä tai herkistymistä ilmenee tai jos oireet pitkittyvät tai voimistuvat.

Silmäkosketus: Huuhtelee välittömästi runsaalla määrällä haaleaa vettä. Poista mahdolliset piilolinssit. Jatka huuhtomista vähintään 5 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin, mikäli ärsytys jatkuu.

Nieleminen: Soita myrkytystietokeskukseen. Huuhtelee suu vedellä. Siirrä uhri raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa jossa on helppo hengittää. Jos henkilö on tajuissaan, anna pieni määrä vettä juotavaksi.


Insektismedel • Hyönteismyrkky



Verksam beståndsdel/
Tehoaine:
Imidakloprid/Imidaklopridi 0,03 vikt-%.
Förpackning: 30 gram per tub


4 x 30 g e

Mot myror • Muurahainen

Bekämpningsmedel. Reg. nr. 5796 Behörighetsklass 2

Käyttäjärhmä: Ammattikäyttö. Lupanumero FI-2018-0001

Användningsområde:

Mot myror och tropiska myror. För användning inomhus och omkring byggnader. All annan användning är otillåten.

Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Läs medföljande anvisningar före användning.

Varoitus
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Valumat on kerättävä.
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
Oheiset ohjeet luettava ennen käyttöä.

UFI: A4S1-30VW-800R-H25T

FLS81722129F

Batchnummer/Tillverkningsdatum: Se förpackningen.
Produkten är hållbar i minst 3 år från produktionsdatum.

Rekisteröinnin haltija/Registreringsinnehavare:

2022 Environmental Science FR S.A.S.

3 place Giovanni Da Verrazzano

69009 LYON

Frankrike/Ranska

Puh/tel. +46 200 899165

www.envu.com



7 313060 008651

SVENSK BRUKSANVISNING

FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Inomhus: Används i industriella/kommersiella anläggningar, hushåll/privata områden., kök, vardagsrum och källare, offentliga byggnader (t.ex. sjukhus, vårdhem)

Utomhus: Terrasser, gångar, verandor, ingångar till skjul och garage, rundt offentliga byggnader (t.ex. sjukhus, vårdhem). EJ för användning på jord, gräsmattor eller rabatter.

Den här produkten innehåller imidaklopid som är giftigt för bin.

Målorganismer: Trädgårdsmyra, mindre husmyra (endast användning inomhus), faraomyra (endast användning inomhus), argentinsk myra.

Maxforce® Quantum kontrollerar och bekämpar myrbon av svartmyror och faraomyror. Bäst verkan uppnås genom att behandla så tidigt som möjligt, d v s så fort man ser myrorna.

Maxforce® Quantum är ett sirapsbaserat lockmedel färdigt att använda med aktiva substansen imidaklopid för bekämpning av myror och deras bon.

Maxforce® Quantum används där en diskret myrbekämpning önskas. Produkten appliceras med "appliceringspistol", är luktfri och färgar inte. Det är en klar, droppfri sirap som kan appliceras både vertikalt och horisontellt, allt efter hur myrorna kommer in och är ett problem.

Vid användning inomhus appliceras produkten längs myrstigar.

Vid användning utomhus appliceras produkten endast i sprickor och springor och längs myrstigar på terrasser, gångar, verandor, ingångar till skjul, garage etc.

Om boet är placerat i stenbelagd jord (t.ex. trädgårdsplattor, betong) kan produkten också placeras direkt i myrboets ingång(ar).

Skydda från bin och väder genom att täcka över med t.ex. en blomkruka eller en tegelsten. Kontrollera att myrorna ändå kan komma åt betet. Applicera inte på hårda ytor eller barmark som används som myrstigar.

Vid användning runt byggnader applicera inte nära avlopp. Om den behandlade området har anslutning till regnvattenuppsamling eller avloppssystem ska betet endast användas på platser som inte blir våta eller hamnar under vatten, dvs skydda produkten från regn, översvämningar eller rengöringsvatten.

Dosering:

Kläm ut 1 klick av betet på cirka 1 cm i diameter (200 mg) per kvadratmeter eller 1 klick per m myrstig. Om ett kök på 10 m² ska behandlas så lägger man ut 10 x 200 mg sirapsklickar.

Applicera max 2 g produkt per myrbo. Ingen spädning.

Vid direkt behandling av myrboet injiceras 2 g (10 klickar) direkt i boets ingång(ar).

Produkten appliceras med en lämplig gelapplikator. Applicera produkten i skydd från direkt solljus och värmekällor (placera t.ex. inte under ett element).

Använd inte produkten där livsmedel, foder eller vatten kan bli förorenat..

Kontrollera betet en gång i veckan.

Om angreppet fortsätter efter en applicering kan ytterligare applicering bli nödvändig.

Efter en applicering är de flesta bon utrotade efter 14 dagar men det kan ta upp till 2 månader.

Undvik kontinuerlig användning av produkten.

OBSERVERA!

- UNDVIK ATT FÅ STÖRRE MÄNGDER MEDEL PÅ SKYDDSKLÄDERNA
- Använd lämpliga skyddshandskar.
- Tvätta händer och exponerade hudområden innan du äter och efter användning.
- När behandlingen är klar avlägsnas den tomma patronen och kasseras på ett säkert sätt.
- Om patronen inte är helt tom avlägsnas den från applikatoren, förseglas med korken som medföljer och förvaras enligt anvisningarna.
- Håll alltid rent från matrester och liknande i de områden där behandling utföres. Lockmedlets attraktion minskar i annat fall.
- Förhindra åtkomst till bete för barn och djur.
- Förvaras i originalförpackningen på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas mot frost.
- Produkten och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Kassera innehållet/behållaren hos godkänd avfallsmottagare.
- Kontaminera inte bäckar, floder eller vattendrag med produkten eller använda behållare.

Första hjälpen

Hudkontakt: Tvätta kontaminerad hud med tvål och vatten, skölj därefter med vatten. Om irritation utvecklas och kvarstår, sök läkarhjälp.

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikliga mängder ljummet vatten, även under ögonlocken, under minst 5 minuter. Glöm inte att ta ur eventuella kontaktlinser. Om symptom kvarstår, sök läkarhjälp.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Kontakta giftinformationscentralen. Sök omedelbart läkarhjälp om symtom uppträder och/eller om stora mängder har förtärats. Om personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Vid medvetlöshet, placera personen i framstupa sidoläge och sök omedelbart läkarhjälp.