

SUOMI KÄYTÖÖHJEET**VAIN AMMATTIHENKILÖIDEN KÄYTÖÖN**

Sisäkäyttö: teolliset/kaupalliset toimitilat; kotitaloudet ja yksityiset alueet keittiöt, olohuoneet ja kellarit; julkiset tilat (esim. sairaalat, hoitokodit)

Ulkokäyttö: terassit, kiveykset, kivipihat, vajojen ja autotallien sisääntulot. Julkiset tilat (esim. sairaalat, hoitokodit). El saa käyttää maassa, nurmikolla tai kukkapenkkeissä.

Vaarallista mehiläisille.

Kohde-eliot: Sokerimuurahainen, aavemuurahainen (vain sisäkäyttö), faaraomuurahainen (vain sisäkäyttö), argentinlainen muurahainen.

Sisäkäytössä valmistetta levitetään muurahaisten kulkureiteille, ja ulkokäytössä valmistetta lisätään rakoihin ja koloihin ja muurahaisten kulkureiteille terasseille, kiveyksille, kivipihalle, vajojen ja autotallien sisääntuloihin jne.

Suojaa mehiläiset valmisteelta ja itse valmiste sääolioilta peittämällä valmisteen lisäyskohda esimerkiksi kukkarukulla tai laatalla. Varmista, että muurahaiset kuitenkin pääsevät syöttiin luokse.

Jos pesä sijaitsee kivetyksellä (mukulakivilattia, betoni jne.), valmistetta voidaan levittää myös suoraan pesän sisääntulolle.

Suojaa mehiläiset valmisteelta ja itse valmiste sääolioilta peittämällä valmisteen lisäyskohda esimerkiksi kukkarukulla tai laatalla. Kun valmistetta käytetään rakennusten ympärillä, sitä

ei saa kuitenkaan käyttää viemärien lähellä. Jos käsitellystä alueesta on yhteys sadeveden keruuseen tai viemäriin, käytä valmistetta vain alueilla, jotka eivät herkästi jää veden alle tai kastu eli jotka on suojattu sateelta, tulvalta ja puhdistusvedeltä.

Annostelu: Valmisteen käyttäminen

Yksi 200 mg:n pisara (halkaisija 1 cm) neliömetriä kohti tai yksi 200 mg:n pisara (halkaisija 1 cm) metrin matkalle muurahaisten kulkureitille. Kun olet käsittelemässä pesiä, purista 2 grammaa tai 10 pisaraa suoraan pesän sisääntulolle.

Valmistetta levitetään käytteen sopivaa geelilevitintä.

Levitä valmistetta paikkaan, jossa se ei ole suorassa auringonvalossa tai suoraan lämmönlähteiden vaikutuksen alaisena (älä käytä sitä esim. lämpöpatterin alla).

Älä aseta paikkoihin, joissa valmistetta voi päästää ruokaan, rehuun tai veteen.

Tarkista syötipisteet kerran viikkossa. Vältä valmisteen jatkuva käyttö.

Jos tuholaisongelmaa ei saada torjuttua yhdellä käyttökerralla, valmistetta voi olla tarpeen käyttää uudelleen.

Huomautukset:

- VÄLTÄ HAALAREIDEN LIALLISTA TAHRIUTUMISTA VALMISTEESTA.
- Pese kädet ja paljas iho ennen aterioita ja käytön jälkeen.
- Estä lasten ja eläinten pääsy syöttien luo.
- Ulkokäytössä levitä tätä biosidivalmistetta vain rakoihin ja koloihin tai suoraan muurahaispesiin.

4 x 30 g e
envu™

Mot myror • Muurahainen

7 313060 008651

MAXFORCE®
Quantum

Insektsmedel • Hyönteismyrkky

CONTAINS

Bitrex

Warning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids effekter.

Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

Innehåll/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Läs medföljande anvisningar före användning.



Säilytyssuositukset

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Suojaa pakkaselta.

Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa.

Valmiste säilyy käyttökeloisena enintään 36 kuukautta.

Varoitus

Erittäin myrkyllistä vesiliölle, pitkääkaisia haittavaikutuksia.

Välttää päästämistä ympäristöön.

Valumat on kerättävä.

Hävitä sisältö vaarallisenä jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

Oheiset ohjeet luettava ennen käyttöä.

Ensiapu

Ihokosketus: Pese saastunut iho saippualla ja vedellä, huuhtele sen jälkeen vedellä. Hakeudu lääkäriin, mikäli ihoärsytystä tai herkistymistä ilmenee tai jos oireet pitkittyvät tai voimistuvat.

Silmäkosketus: Huuhtele välittömästi runsalla määrellä haaleaa vettä. Poista mahdolliset piilolinssit. Jatka huuhtomista vähintään 5 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin, mikäli ärsytyys jatkuu.

Nieleminen: Soita myrkytystietokeskukseen. Huuhtele suu vedellä. Siirrä uhri raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa jossa on helppo hengittää. Jos henkilö on tajuissaan, anna pieni määrä vettä juotavaksi.

Rekisteröinnin haltija/Registeringsinnehavare:

2022 Environmental Science FR S.A.S.

3 place Giovanni Da Verrazzano

69009 LYON

Frankrike/Ranska

Puh/tel. +46 200 899165

www.envu.com

7 313060 008651

SVENSK BRUKSANVISNING**FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV PROFESSIONELLA ANVÄNDARE**

Inomhus: Används i industriella/kommersiella anläggningar, hushåll/privata områden., kök, vardagsrum och källare, offentliga byggnader (t.ex. sjukhus, vårdhem)

Utomhus: Terrasser, gångar, verandor, ingångar till skjul och garage, runt offentliga byggnader (t.ex. sjukhus, vårdhem). EJ för användning på jord, gräsmattor eller rabatter.

Den här produkten innehåller imidakloprid som är giftigt för bin.

Målorganismer: Trädgårdsmyra, mindre husmyra (endast användning inomhus), faraomyra (endast användning inomhus), argentinsk myra.

Maxforce® Quantum kontrollerar och bekämpar myrbon av svartmyror och faraomyror. Bäst verkan uppnås genom att behandla så tidigt som möjligt, d v s så fort man ser myrorna.

Maxforce® Quantum är ett sirapsbaserat lockmedel färdigt att använda med aktiva substansen imidakloprid för bekämpning av myror och deras bon.

Maxforce® Quantum används där en diskret myrbekämpning önskas. Produkten appliceras med "appliceringspistol", är luktlig och färgar inte. Det är en klar, droppfri sirap som kan appliceras både vertikalt och horisontellt, allt efter hur myrorna kommer in och är ett problem.

Vid användning inomhus appliceras produkten längs myrstigar.

Vid användning utomhus appliceras produkten endast i sprickor och springor och längs myrstigar på terrasser,gångar, verandor, ingångar till skjul, garage etc.

Om boet är placerat i stenbelagd jord (t.ex. trädgårdsplattor, betong) kan produkten också placeras direkt i myrboets ingång(ar).

Skydda från bin och väder genom att täcka över med t.ex. en blomkruka eller en tegelsten. Kontrollera att myrorna ändå kan komma åt betet. Applicera inte på hårdta ytor eller barmark som används som myrstigar.

Vid användning runt byggnader applicera inte nära avlopp. Om den behandelade området har anslutning till regnvattenuppsamling eller avloppssystem ska betet endast användas på platser som inte blir våta eller hamnar under vatten, dvs skydda produkten från regn, översvämnningar eller rengöringsvatten.

Dosering:
Kläm ut 1 klick av betet på cirka 1 cm i diameter (200 mg) per kvadratmeter eller 1 klick per m myrstig. Om ett kök på 10 m² ska behandlas så lägger man ut 10 x 200 mg sirapsklickar.

Applicera max 2 g produkt per myrbo. Ingen spädning.
Vid direkt behandling av myrboet injiceras 2 g (10 klickar) direkt i boets ingång(ar).
Produkten appliceras med en lämplig gelapplikator. Applicera produkten i skydd från direkt solljus och värmekällor (placera t.ex. inte under ett element).

Använd inte produkten där livsmedel, foder eller vatten kan bli förorenat..
Kontrollera betet en gång i veckan.

Ogonkontakt: Skölj omedelbart med rikliga mängder ljummet vatten, även under ögonlocken, under minst 5 minuter. Glöm inte att ta ur eventuella kontaktlinser. Om symptom kvarstår, sök läkarhjälp.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Kontakta giftinformationscentralen. Sök omedelbart läkarhjälp om symptom uppträder och/eller om stora mängder har förtärats. Om personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Vid medvetlöshet, placera personen i framstupa sidoläge och sök omedelbart läkarhjälp.

• UNDVIK ATT FÅ STÖRRE MÄNGDER MEDEL PÅ SKYDDSKLÄDERNA
• Använd lämpliga skyddshandskar.
• Tvätta händer och exponerade hudområden innan du äter och efter användning.

• När behandlingen är klar avlägsnas den tomma patronen och kasseras på ett säkert sätt.

• Om patronen inte är helt tom avlägsnas den från applikatorn, försegglas med korken som medföljer och förvaras enligt anvisningarna.

• Håll alltid rent från matrester och liknande i de områden där behandling utföres. Lockmedlets attraktion minskar i annat fall.

• Förhindra åtkomst till bete för barn och djur.

• Förvaras i originalförpackningen på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas mot frost.

• Produkten och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Kassera innehållet/behållaren hos godkänd avfallsmttagare.

• Kontaminera inte bäckar, floder eller vattendrag med produkten eller använda behållare.

Första hjälpen
Hudkontakt: Tvätta kontaminerad hud med tvål och vatten, skölj därefter med vatten. Om irritation utvecklas och kvarstår, sök läkarhjälp.

9913_00 - MAXFORCE QUANTUM (FLS) 4x30g - FLS81722129F.indd 2

10/02/2023 13:24