



Exteris® Stressgard®



Varning

- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 EUH 401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Undvik att inandas spray.
 Använd skyddshandskar.
 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

SE85795694D - ARTICLE 85748394

Batch nummer/ produktionsdatum: på emballaget.
 Produkten är hållbar minst 2 år från produktionsdatum

Innehavare:
 Bayer AB
 c/o Bayer A/S
 Arne Jacobsens Allé 13
 DK-2300 København S
 Danmark
www.environmentalscience.bayer.se
 Tel. +45 45 23 50 00



Bayer

Användningsvillkor:

Gröda	Syfte	Max antal Behandlingar per år	Behandlings intervall [dagar]	Max dos vid varje behandling		
				Produkt	Fluopyram	Trifloxystrobin
Tee, green och kragre på golfbanor	Mot snömoegel	2	14	10 L/ha	125 g/ha	125 g/ha

Användning:

EXTERIS® StressGard bör användas förebyggande mot snömoegel, eller i ett tidigt stadium av angrepp, för att uppnå bäst resultat. För god effekt behöver sprutvätskan fördelas jämt och med god täckning på växterna.

EXTERIS® StressGard har även i försök visat sig förbättra gräskvaliteten och därigenom också spelbarheten.

Verknings sätt:

EXTERIS® StressGard kan appliceras på golfbanor under hela året.

EXTERIS® StressGard är ett vattenlösligt suspensionskoncentrat.

De aktiva substanserna verkar systemiskt (fördelas jämnt i bladen med saftströmmen) och verkar både förebyggande och kurativt mot snömoegel, (*Monographella nivale*), på golfbanor.

Appliceringsmetod:

Behandling kan ske med traktorspruta eller ryggspruta.

Använd alltid funktionstestade och kalibrerade sprutor. Undvik vindavdrift. Behandlingen bör alltid göras på torra plantor.

Dosering:

Använd 10 L EXTERIS® StressGard per hektar utblandad i 200-600 L vatten. Användningen är begränsad till maximal 2 gånger per år med ett minimum av 14 dagar mellan behandlingarna.

För mindre ytor som behandlas med ryggspruta använd 100 ml och 2-6 L vatten som räcker till behandling av 100 kvm.

Tillredning av sprutvätskan

Använd en väl rengjord spruta. Stå med sprutan på biobädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på 3/4 av vattenmängden, skaka förpackningen och tillsätt EXTERIS® StressGard under omrörning. Fyll på resterande vattenmängden. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning. Saknas möjlighet till omrörning bör sprutvätskan användas inom ett par timmar, annars finns risk för sedimentering.

Rengöring av sprututrustning

Sprutan sköljas med vatten tre gånger, sköljvattnet hålls ut på den behandlade ytan. Rengör ej sprutan i närheten av sjö eller vattendrag. Bered aldrig mer sprutvätska än vad som går åt för behandling.

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert Växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Ytterligere villkor

Handskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Resistens

EXTERIS® StressGard består av två aktiva substanser som hämmar respirationen i svampens celler. Fluopyram tillhör kemiska gruppen pyridinyl-etyl-benzamider (FRAC-kod 7). Trifloxystrobin tillhör strobiluriner (kemiska gruppen oximinoacetat) (FRAC-kod 11).

För att minimera risken för uppkomst av resistens bör man alternera med andra produkter och helst bara göra en behandling per säsong. Effekten av EXTERIS® StressGard är också bäst om behandlingen sätts in tidigt i svampens utveckling (förebyggande behandling).

Lagring:

Förvaras frostfritt och ej över 40°C, i sluten originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskild från födoämnen.

Produktrester:

Rester, spill och förpackning som inte är rengjord klassas som farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen för mer information.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Exteris Stressgard med registreringsnummer 5461.

UPMA: Mot myntfläcksjuka på tee, green och krage på golfbanor.

UPMA gäller utöver användningsområden som framgår av produktgodkännandet

Gröda	Syfte	Max antal Behandlingar per år	Behandlings intervall [dagar]	Max dos vid varje behandling		
				Produkt	Fluopyram	Trifloxystrobin
Tee, green och krage på golfbanor	Mot myntfläcksjuka (<i>Sclerotinia Homeocarpa</i>)	2	14	10 L/ha	125 g/ha	125 g/ha

Vid spridning av produkten ska 200-600 L vatten per hektar användas.

Den totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 20 L produkt per hektar.

Antalet behandlingar per odlingssäsong med denna produkt får aldrig vara fler än två, oavsett om du följer produktens etikett och bruksanvisning eller användningsvillkoren för detta utvidgade användningsområde.

Ytterligere villkor - se alla de villkor som gäller för godkännandet av Exteris Stressgard.

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut. Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Den som använder växtskyddsmedlet har ansvaret när det gäller bristande effektivitet eller fitototoxicitet hos den produkt för vilken utvidgat godkännande för mindre användningsområde beviljats.



Exteris® Stressgard®



Varning

- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.
 EUH 401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Undvik att inandas spray.
 Använd skyddshandskar.
 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

SE85795694D - ARTICLE 85748394

Batch nummer/ produktionsdatum: på emballaget.
 Produkten är hållbar minst 2 år från produktionsdatum

Innehavare:
 Bayer AB
 c/o Bayer A/S
 Arne Jacobsens Allé 13
 DK-2300 København S
 Danmark
www.environmentalscience.bayer.se
 Tel. +45 45 23 50 00



Bayer