

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:**Satış numarası:****Sağlık Bakanlığı Ruhşat Tarihi ve Numarası:** 25.02.1999 – 2010 / 172**Zararlı türünne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama alanları:**

Zararlı Türü - Yaşam-esresi	Uygulama alanları	Uygulama alanı ve şekli	İstasyon içermeyen & uygulanması durum	Uygulama aralığı
Fare - Ergen	Mesken ve mesken çevreleri	İstasyonlar içerisinde diper poplasyonlarında 5 m'de bir, yoğun poplasyonlarında 3 m'de bir uygulanır.	İstasyon başına 15-20 gram	15 günde bir kontrol nöbeti, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.
Sığan - Ergen	Mesken ve mesken çevreleri	İstasyonlar içerisinde diper poplasyonlarında 10 m'de bir, yoğun poplasyonlarında 5 m'de bir uygulanır.	İstasyon başına 50-100 gram	10 günde bir kontrol nöbeti, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.

1 mum blok yemini ağırlığı: 15, 25 gr

Kullanma şekli:

- Ambadaju aptılmamasından kaçınıyarak mücadelede tohum uygulamalarında mutlaka ELDIVEN kullanınız. Bu hem sizin koruyacağınız hem de fare ve seğirmaların insan kokusundan etkilenecek yen tüketiminden kaçınmanızı engelleyecektir.
- Yen istasyonlarınızın uygulaması sonrasında ledef diper canlıların temasını engelleyecektir ve fare ve seğirmalar tüketimini data koruy olmazsa sağlayacak olanları seprit.
- UYGULAMA MUTLAKA YEM İSTASYONU İÇERİSİNDE YAPILMALIDIR. Yem istasyonları çocukların ve hedef diper canlıları tarafından açılmışa kارşı korunaklı ve içerisinde yerin dış emenlerden koruyacak dayanıklılıkta olsalıdır.
- Yen istasyonlarının yerleştirileceği en iyi alanlar, kemirtilmiş alanlar, kemirgen dişlerinin görüldüğü yerler, asma tavaların ve insan aktivitesinin az olduğu alanları seprit.
- Zararlı tespit edilen uygun alanlara YEM İSTASYONLARI yerleştirilmeli ve içeriye uygulama tablosuna uygun miktarla ürün bırakılmışmalıdır.
- 2-3 gün aralıklarla yen istasyonlarını/yugulama yapılan yerler kontrollere alınken yerlerin içinde yemlerini ekleyiniz.
- Tüketilmeyen yemelerin bulunduğu istasyonları yerlerini ve bulapık ve bozulmuş yemeleri yemis ile değiştirebilir.
- Fare ve seğirmalar izleni kayboluncaya kadar uygulamaya devam ediniz.

Üretici firmamıza adı ve adres:Lipha Tech S.A.S. Production centre, Ay Jean Serre,
ZA Mulard, 47480 Port du Cassé, FRANSA**Dolum yeri adı ve adresi:**Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti
Barış Mah. Anıtkabir Cad. No: 1 41410 Gebze/KOCAELİ**Ruhşat sahibinin adı ve adresi:**222 Environmental Science Turkey Ziraat (İnşaat) Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Allianz Tower Kucukbağkale Mah. Kayıştag Cad. No: 1 Kat: 20/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL

İthalat miktarı: 7,5 kg

Dolum miktarı: 50 gr (0 x 15 gr) - 120 gr (8 x 15 gr) - 150 gr (10 x 15 gr) - 180 gr (12 x 15 gr) - 225 gr (15 x 15 gr) - 250 gr (10x25 gr) - 300 gr (20 x 15 gr) - 330 gr (22 x 15 gr) - 450 gr (30 x 15 gr) - 1000 gr (40 x 25 gr) - 1650 gr (70 x 15 gr) - 1500 gr (100 x 15 gr) - 3000 gr (100 x 15 gr) - 5000 gr (200 x 25 gr) - 7500 gr (500 x 15 gr) - 10000 gr (400 x 25 gr)

Net miktar: 50 gr (0 x 15 gr) - 120 gr (8 x 15 gr) - 150 gr (10 x 15 gr) - 180 gr (12 x 15 gr) - 225 gr (15 x 15 gr) - 250 gr (10x25 gr) - 100 gr (20 x 15 gr) - 330 gr (22 x 15 gr) - 450 gr (30 x 15 gr) - 1000 gr (40 x 25 gr) - 1650 gr (70 x 15 gr) - 1500 gr (100 x 15 gr)

(15gr) - 3000 gr (100 x 15gr) - 5000 gr (200 x 25 gr) - 7500 gr (500 x 15 gr) - 10000 gr (400 x 25 gr)

**ÜRÜN TİPİ (14)
RODENTİSIT****İkiyıldızlı önləməri:****Genel böteri** Tehlikeli tozgenin dışına çıkarınız. Etikelenmiş kişiyi stabil yan konumda tutıp taşıyınız. Kirleñmiş giysilerini hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertara edin. Minimum 48 saat boyunca tibbi gözetim altında bulundunuz.**Solumunuz halisde** Temiz havaya çıkarınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kipartıtmayın, omurlandırın. Sıptomlar devan edəse doktoru başvurunuz. **Cilt ilə temas** Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Sıptomlar devan edəse doktoru çağırınız.**Göz ilə temas** Flemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahi olmak et az 15 dakika boyunca lince yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözden yıkamaya devam ediniz. Eğer göz tahrif olmuşsa veya gözde kırmızılık devam ediyorsa, oftalmologiste (göz doktoruna) görünüz.**Yutulması halisde** Kusturmayın. Ağzı çalkalayınız. Aktif komür (karbon) alınız. Doktoru veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.**Antidotu ve gereklili bilgiler:**
VC-K1 tabik edilir.**ZEHİRLENME DURULARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (ZEM) NİN H4 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.****ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**Ürün serin, kuru ve güneş ışıklarından uzakta $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ de muhafaza ediniz.

Arialar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELƏRİ

E373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarında hasar yolu açabilir.

E412 Sicil ortamda uzan süre kalıcı, zararlı etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskləri önlemek üçün, kullanım təlimatlarına uyğun.

ÖNLEM İFADELƏRİ

P260 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / böharmı / spreyi in solumuya.

P273 Çevrəye verilməsindən kaçının.

P280 Konuyucu edliben/konuyucu kiyafet/göz koruyucusu / yüz konuyucu kullanın.

P314 Kendinizi iyи hissetməzseniz, tibbi təsviye / müdahale alınız.

PS01 İşergi/kabı yerel yönetməliklər görə bertara edin.



Bakanlık Onayı:

Dr. KEMAL RAMAZANOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

01 Nisan 2024

KULLANICI GRUBU
(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)
**KULLANMADAN ÖNCƏ ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ**

envu™
eRodilon® Mum Blok

Fare ve Sığan Mücadelesi İçin Rodentisit**Formülasyon şekli**
Mum Blok**Aktif maddenin adı ve miktarı (%) a/a)**
Difethialone, CAS No: 104653-34-1 % 0,0025**Yardımcı maddeler ve miktarları (%)**

%99.9975 diğer yardımcı maddeler ve Bitrex ile %100'e

tümamlanır.

COCUKLARDAN GIDA VE HAYVAN YEMERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMASIVE HAZIRLIK ASASINDA HİCBER SEY YEMEYİNİZ,
İCMELİNİZ, SIGARASI KULLANMAYINIZ.
INSAN VE CEVRESAGLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMƏK İÇİN,
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.Ambalaj açılmışdır. 1 ay içinde kullanınız.
Ürünün raf ömrü $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ de 2 yıldır.**Bos ambalaşma şekli:** Bos ambalajları usulüne uygun olarak simit ediniz.**Zehirlenme belirtilleri:**

Eğer böyük miktarlarda yutulmuşsa, aşağıdakı semptomlar meydana gelebilir: Kan ırtiva eden idrar, Kanlı dişki, Dişeti kanaması, Burun kanaması, Çırır ve kanama olgusu.

Ilker LODOS
Mesul Müdür
Kalite Kontrol Müdürü

2022 Environmental Science TURKEY
Ziraat, Ornithologiya ve Ticaret Limited Şirketi
Allianz Tower Kucukbağkale Mah. Kayıştag Cad. No: 1 Kat: 20/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL