

Herbicida con acción pre y post emergente, selectivo para plantaciones forestales de Pinos y Eucaliptos, de amplio espectro y bajo impacto ambiental.


Atributos principales y características específicas:

Ingrediente activo	Isoxaflutole (750 g/kg)
Formulación	Gránulos dispersables en agua (WG)
Mecanismo de acción	Inhibidor de la síntesis de carotenoides (F2)
Dosis Recomendada	100 - 200 g/ha

Recomendaciones para una Óptima Aplicación:

Fordor® puede aplicarse con equipos manuales, mecánicos, aplicación de ultrabajo volumen y drones, estando debidamente calibrados. Preferiblemente con un sistema de agitación incorporado. Se debe tener una cobertura homogénea y uniforme de no menos de 30 gotas/cm² con un espectro de gotas medianas (200 - 400 µm). Aplicar con condiciones atmosféricas favorables. No requiere coadyuvante corrector.

Ventajas:



Isoxaflutole es fotoestable. Esto le permite permanecer en los suelos secos luego de su aplicación, sin pérdidas de eficacia esperando las lluvias, posibilitando el efecto de recarga residual.

Por su alta eficacia y residualidad, minimiza la competencia de las malezas, **permitiendo mayor rendimiento de madera por hectárea.**

Permite efectuar aplicaciones manuales, mecanizadas o por dron sobre los plantines sin efectos fitotóxicos.

Excelente controlador en pre emergencia del género ***Conyza* spp. (Rama Negra).**

No hay acumulación de residuos en napas freáticas, por su dinámica química.

Es degradado totalmente por la actividad microbiana del suelo, **lo que no afecta a los organismos del suelo.**

Malezas que controla:

Nombre Científico	
<i>Amaranthus quitensis</i>	<i>Imperata brasiliensis</i>
<i>Amaranthus</i> spp.	<i>Ipomoea</i> spp.
<i>Amaranthus viridis</i>	<i>Paspalum</i> spp.
<i>Conyza bonariensis</i>	<i>Richardia brasiliensis</i>
<i>Chenopodium</i> spp.	<i>Setaria</i> spp.
<i>Cynodon dactylon</i>	<i>Sida rhombifolia</i>
<i>Digitaria sacchariflora</i>	<i>Veronica</i> spp.
<i>Digitaria sanguinalis</i>	

