

 **RACUMIN®**
Foam

Rodenticida

✓ **Rodenticida de contacto contra ratas y ratones**
(*Rattus norvegicus* y *Mus musculus*)

✓ **Rodenticida de contacto pronto a usar, contra ratas e ratos domésticos**
(*Rattus norvegicus* e *Mus musculus*)

Espuma en aerosol (AE)

Composición: Cumatetralilo 0,4062 %, Isotridecanol etoxilado 1,8%

Registro en el R.O.B. nº ES/MR(NA)-2018-14-00358

USO PROFESIONAL ESPECIALIZADO

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Espuma aerosol (formulação de contato pronta para o uso) contendo 0,4062% (p/p) cumatetralilo

Contém: Isotridecanol etoxilado

Autorização de venda nº PT/DGS ARMPB-ml-17/2018 concedida pela DGS

USO PROFISSIONAL

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



500 ml e

(450 g de solución y
41 g de propelente)

envu

Contacto e ingestión
Contacto e ingestão



ES

PT

PELIGRO

Racumin® Foam

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta. Puede dañar al feto. Puede provocar daños en los órganos (sangre), tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Solicitar instrucciones especiales de uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. No respirar los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. Guardar bajo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimine el contenido y/o su recipiente, así como los roedores muertos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

PERIGO

Racumin® Foam

Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Provoca irritação ocular grave. Pode afetar o nascituro. Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Pedir instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fúscas, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. Não respirar os aerossóis. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Continue a enxaguar. Recolher o produto derramado. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Evitar a libertação para o meio ambiente. Armazenar em local fechado à chave. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar o conteúdo/recipiente em local adequado à recolha de resíduos perigosos. Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos - CIAV - Tel.: 800 250 250



Registrado y distribuido por:

2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON
800 166071

Lote y fecha de fabricación: ver envase
Fecha de caducidad: 4 años después de la fecha de fabricación.

Racumin es un marca registrada de Envu
Bitrex es una marca registrada de MacFarlan Smith, Edinburgh

Registrado por

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
R. Quinta do Pinheiro, 5 - 2794-003 CARNAXIDE

Distribuido por:

2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON
800 166071

Lote e data de fabrico - marcados na embalagem.
Prazo de validade - 4 anos após a data de fabrico.

Racumin é uma marca registrada da Envu
Bitrex é uma marca registrada de MacFarlan Smith, Edinburgh



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada, do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado. As águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Ed.1121 - POS86239337H - **ARTICLE 84079243**

UFI: R3J0-W041-K00G-FU17

3 650



Racumin Foam es un rodenticida en formulación en aerosol que libera su contenido en forma de espuma. Es un producto anticoagulante para el control de ratas y ratones en interior de edificaciones para protección de la salud y de materiales (por ejemplo, líneas o tuberías de cable cerradas, subestructuras de, p. Ej., armarios eléctricos o armarios de alta tensión, cavidades en paredes y revestimientos de paredes, entradas en orificios para ratas, aberturas de pared, pasajes estrechos, falsos techos, paredes aislantes, pozos de servicio, instalación ejes, travesaño de estructuras de andamios). Los roedores ingieren el producto tras limpiarse después de entrar en contacto con la espuma. Racumin Foam se usará bajo circunstancias excepcionales si otras formas de control químico o cebos convencionales no han sido efectivos.

El producto contiene un agente amargante y un colorante.

Autorizado para:

Control de ratas y ratones por personal profesional especializado.

Instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Primeros auxilios

Este producto contiene una sustancia anticoagulante.

En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces y orina.

Antídoto: Vitamina K₁ administrada solo por personal médico / veterinario.

En caso de:

- Exposición dermal, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.
- Exposición ocular, compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retírelas, enjuagar los ojos con agua o líquido para enjuagar los ojos, mantener los ojos abiertos durante al menos 10 minutos.
- Exposición oral, enjuague la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provoque el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono: 91 596 04 20). Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.

Cuando la espuma se coloque cerca de sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua.

Peligroso para fauna salvaje.

Medidas de Mitigación del riesgo

Generales:

- Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes (ej: usuarios del área tratada o sus alrededores) sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas, si los hay).
- No utilizar en áreas donde se sospeche que existe resistencia a la sustancia activa.
- Los productos no deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento.
- No alternar el uso de diferentes sustancias activas anticoagulantes con potencias comparables o menores con el propósito de gestionar las resistencias. Si se alternan, considerar el uso de rodenticidas no anticoagulantes, si existen, o un rodenticida anticoagulante más potente.

ES

- No lavar los utensilios utilizados en los puntos de cebo con agua entre aplicaciones.
- Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración.
- No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para monitorizar la actividad de roedores.
- No utilizar el producto en tratamientos de cebado por pulsos.
- Este producto solo se usará en circunstancias excepcionales si formulaciones no químicas o cebos convencionales no han sido efectivos.
- Este producto en espuma solo se usará en interior y en lugares no accesibles para niños ni animales no objeto (por ejemplo: tuberías o líneas de cable cerradas, subestructuras de, por ejemplo, cuadros eléctricos o de alto voltaje, cavidades en paredes y revestimientos de paredes).
- Las áreas tratadas en los edificios deben estar aseguradas para evitar el acceso de niños y mascotas.
- Para evitar residuos en alimentos y alimentos para animales cuando se utilice el producto biocida, mantenga una distancia de al menos 2 metros a lugares donde se almacenen, preparen e ingieran alimentos y alimentos para animales.
- Antes de las medidas de control de roedores, todos los usuarios de las instalaciones, edificios y sus alrededores donde se coloque la espuma, tienen que estar informados sobre los riesgos para los humanos, las mascotas y los animales salvajes. También deben estar informados sobre las medidas en caso de intoxicación, mala aplicación de la espuma o el hallazgo de roedores muertos (de acuerdo con la etiqueta del producto).

Específicas del uso:

- Aplicar medidas de control preventivas (ej: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión.
- Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas.
- Este producto solo se usará en interior y en lugares no accesibles para niños ni animales no objetivo.

Modo de empleo

Antes de usar Racumin Foam lea y siga la información del producto así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo.

Instrucciones de uso:

- Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación.
- Se recomiendan 2 aplicaciones por tratamiento.
- Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej. grano suelto o residuos de alimentos). A parte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más fácil de alcanzar.
- El producto debe ser usado como parte del plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control.
- El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras...)
- Cuando el producto se utiliza en zonas públicas, las zonas tratadas deben marcarse durante el período de tratamiento y una señal explicativa debe informar sobre el riesgo de envenenamiento primario y secundario por los anticoagulantes, así como las medidas de primeros auxilios.

ES

- Colocar el producto fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales no objetivo (por ejemplo, líneas de cable o tuberías cerradas, subestructuras de, por ejemplo, cuadros eléctricos o de alto voltaje, cavidades en paredes, revestimientos de paredes, entradas a agujeros de ratas, aberturas de pared, pasos estrechos, falsos techos, paredes aislantes, acometidas, pozos, travesaño de andamios).
- El agujero no debe llenarse completamente con la espuma para que los animales continúen reconociendo los pasajes y caminos habituales. Si se llena el agujero completamente, los animales pueden dudar en pasar.
- La cantidad de puntos de tratamiento depende del diseño de los locales o del edificio.
- No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.
- Use guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación (el material del guante debe ser proporcionado por el titular de la autorización dentro de la información del producto).
- Es obligatorio el uso de máscara o gafas protectoras durante la manipulación del producto.
- Durante el uso del producto no comer, beber o fumar.
- Lavar las manos y áreas de la piel expuestas después de utilizar el producto.
- Retirar el producto sobrante al final del tratamiento.

Método y dosis de aplicación

Antes de aplicar Racumin Foam, verifique que el envase se encuentra a la temperatura ambiente. Agitar el bote aerosol hasta oír la bola en el interior.

Aplicar presionando la válvula del aerosol, dirigiendo la espuma a la superficie a tratar.

Preferentemente se colocará a la salida de los escondites

y madrigueras, en los huecos de las construcciones y/o caminos utilizados habitualmente por los roedores, en locales inaccesibles a niños, mascotas y otros animales.

Dosis de aplicación:

Ratas: 20 a 30 g de espuma (bola con 11 cm de diámetro), dependiendo del grado de infestación.

Ratones: 4 a 30 g (6-11 cm de diámetro), dependiendo del grado de infestación.

Aplicar las cantidades indicadas por superficie tratada.

Dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, la espuma persiste entre 7 a 12 días después de aplicada.

Debido a su modo de acción retardado, los raticidas anticoagulantes pueden tomar de 4 a 10 días para ser efectivos después del consumo efectivo del producto.

Limpieza:

- No lave los utensilios utilizados en el tratamiento con agua entre aplicaciones.
- Deseche los roedores muertos de acuerdo con los requisitos locales.
- Después de la finalización de la medida de control de plagas, recolecte el producto residual en el sitio usando toallas secas.

Seguimiento del tratamiento- Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

- La frecuencia de las visitas a las áreas tratadas debe ser a criterio del aplicador, en virtud de las encuestas realizadas al comienzo del tratamiento. Esa frecuencia debe ser consistente con las recomendaciones proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.
- Si después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa.
- Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida no anticoagulante o un rodenticida anticoagulante más potente. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa.
- Al final del tratamiento elimínense el cebo no consumido a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
- Los roedores son transmisores de enfermedades. No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilice guantes o utensilios tales como pinzas para su eliminación.
- Evite el contacto con la piel al desechar los restos de la espuma.
- Se recomienda como método de tratamiento la incineración.
- Al final del tratamiento elimínense las toallitas de limpieza a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Almacenamiento

- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
- Mantener el envase cerrado y alejado de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja.

Advertencias al Usuario: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.



Racumin Foam é um rodenticida anticoagulante de contato, para controle de ratas e ratos domésticos em espaços interiores. Os roedores ingerem o produto após contato com a espuma, durante a atividade de limpeza do pelo. **Racumin Foam** deve ser utilizado como medida adicional no controle de ratos e ratas, em paralelo com o controle regular realizado com iscos, principalmente em locais muito úmidos, com disponibilidade de alimentos ou nos casos em que se verifique a rejeição dos iscos. O produto contém um agente amargante.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto obtida no ponto de venda, antes de o utilizar.

- Antes da iscagem, investigar a espécie de roedor, o local de permanência preferencial, a causa da infestação e a dimensão da mesma.
- Recomendam-se duas aplicações por tratamento.
Remover fontes de alimento e bebidas facilmente acessíveis para roedores (p. ex., cereais derramados ou restos de alimento etc.). Além disso, não limpar a área de infestação antes das aplicações, uma vez que isso perturba os roedores e dificulta a ingestão do isco.
- Utilizar o produto somente como parte de gestão integrada de pragas, juntamente com medidas de higiene e, se aplicável, métodos físicos de controle de pragas.
- O produto deve ser colocado diretamente no ambiente em que os roedores tenham sido observados (p. ex. corredores de roedores, ninhos, locais de alimentação, buracos, tocas, etc.).
- Segundo as boas práticas, quando o produto se utiliza em áreas públicas, as zonas tratadas devem estar assinaladas durante o período de tratamento, informando dos riscos de envenenamento primário ou secundário causados pelo produto, indicando também as medidas de primeiros socorros, junto dos pontos de iscagem.
- Aplicar o produto em locais não acessíveis a crianças, pássaros, animais domésticos, animais de criação e outros animais não-alvo (p. ex. linhas de cabos ou tubagens fechadas, estruturas de base como de caixas de instalações elétricas, compartimentos ocultos em paredes e revestimentos de paredes, entradas de construções, aberturas em paredes, passagens estreitas, tetos falsos, paredes isolantes, condutas de distribuição, condutas de instalação, vigas de andaimes).
- Os buracos/passagens não devem ser completamente preenchidos com espuma, para que os animais ainda possam reconhecer seu caminho usual. Se os buracos/passagens estiverem completamente preenchidos com espuma, os roedores podem recusar-se a passar.
- O número de locais em que deve ser aplicada espuma depende da estrutura das instalações ou do prédio.
- Deve-se impedir totalmente o contato do produto com alimentos, bebidas, rações, louças e superfícies de preparação de alimentos.
- Utilizar luvas resistentes a substâncias químicas ao manusear o produto (nitrilo, classe 6, de acordo com a norma EN374 com espessura > 0,4 mm).
- Utilizar proteção ocular ao manusear o produto.
- Não comer, beber ou fumar ao manusear o produto. Após utilizar o produto lavar as mãos e as áreas da pele que tiveram contato direto com o produto.
- Se, após 35 dias, ainda forem consumidos iscos e não se observar redução das atividades dos roedores, deve-se determinar a causa provável. Nesse caso, deve-se suspeitar de resistência ao princípio ativo utilizado e testar a utilização de um princípio ativo mais potente e de medidas de combate alternativas, tais como ratoeiras.

- Os restos de produto remanescentes nas superfícies tratadas, devem ser removidos por meio de panos ou toalhetes secos após os tratamentos.
- Devido ao modo de ação retardado, os raticidas anticoagulantes podem demorar entre 4 a 10 dias a demonstrar eficácia, após o contato efetivo com o produto.

DOSE DE APLICAÇÃO:

Ratas: 20 a 30 g de espuma (bola com 11 cm de diâmetro).

Ratos: 4 a 30 g (bola com 6 cm de diâmetro).

Aplique a dose indicada por buraco/trilho dos roedores. A mesma quantidade pode igualmente ser aplicada repartida em porções de menor dimensão ao longo de cada trilho.

Não tapar as entradas dos trilhos dos roedores com a espuma, para que estes continuem a percorrer os locais tratados. Dependendo das condições de temperatura e humidade, a espuma persiste entre 7 a 12 dias.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO

- Sempre que possível informe eventuais circunstâncias da realização da campanha de desratização em curso.
- Não utilizar em locais em que haja suspeita de resistência contra o princípio ativo.
- Não utilizar o produto por mais de 35 dias sem verificar a situação de infestação e a eficácia da iscagem.
- A alternância entre diversos anticoagulantes com potência parecida ou menor não é uma opção segura para gestão de resistência. Em caso de resistência, se não for possível aplicar princípios ativos com outros mecanismos de ação, devem-se utilizar anticoagulantes mais potentes.
- Entre as aplicações, não lavar com água os utensílios utilizados para cobertura e proteção dos locais dos iscos.
- Elimine os roedores mortos de acordo com as normas locais.
- Não utilizar Racumin Foam de forma permanente ou para monitorização de atividade de roedores.
- Não utilizar o produto para iscagem faseada.
- Utilizar o produto somente em casos nos quais as medidas de combate não-químicas e iscos convencionais não sejam eficazes.
- Esta espuma é apenas para uso em interiores e em locais não acessíveis a crianças e animais não-alvo (p. ex. linhas de cabos ou tubagens fechadas, estruturas de base como de gabinetes elétricos ou gabinetes de alta tensão, compartimentos ocultos em paredes e revestimentos de paredes, entradas de construções, aberturas em paredes, passagens estreitas, tetos falsos, paredes isolantes, condutas de distribuição, condutas de instalação, andaimes).
- As superfícies tratadas em prédios devem ser protegidas, de maneira a impedir o acesso de crianças e animais domésticos.
- Para evitar resíduos em alimentos e rações, ao utilizar o produto, é necessário manter uma distância de pelo menos 2 m de locais em que alimentos e rações sejam armazenados, preparados ou consumidos.
- Antes de aplicar a espuma, todos os usuários das instalações ou do edifício e do seu entorno, devem ser informados sobre os riscos para pessoas, animais domésticos e selvagens. Deve-se informar também sobre:
 - Primeiras medidas a serem tomadas em caso de intoxicação;
 - Medidas a serem tomadas no caso de uma má utilização da espuma;
 - A descoberta de roedores mortos;

PT

Limpeza:

Não aplique **Racumin Foam** em superfícies passíveis de serem manchadas. Realize um teste prévio sempre que necessário. Após o tratamento, recolha o remanescente de produto com toalhetes/panos de limpeza secos. Os roedores são transmissores de doenças (p. ex. leptospirose). Não tocar nos roedores mortos diretamente com as mãos. Ao eliminá-los, utilizar luvas de proteção ou utensílios adequados, tais como pinças.

Acompanhamento:

A frequência das inspeções deve ser determinada pelo responsável pelo tratamento, seguindo as boas práticas. Se, após 35 dias, ainda for consumido produto e não se observar redução das atividades dos roedores, deve-se reavaliar a causa provável. Nesse caso, deve-se equacionar a resistência ao princípio ativo de Racumin foam e deve testar-se a utilização de um princípio ativo mais potente e/ou de medidas de combate alternativas, tais como ratoeiras.

Instruções de primeiros socorros e medidas de emergencia para proteger o ambiente:

Este produto contém uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, podem ocorrer, mesmo que tardiamente, os seguintes sintomas: sangramentos nasais e gengivais. Em casos graves, pode haver ocorrência de hematomas e sangue nas fezes e urina.

Antídoto: Vitamina K₁, a qual só deve ser administrada por profissionais da área médica/veterinária.

Perigoso para a vida selvagem.

Em caso de:

- Exposição da pele: lavar primeiro apenas com água e, em seguida, com água e sabão.
- Exposição dos olhos: lavar os olhos com produto próprio ou água, mantendo as pálpebras abertas por no mínimo 10 minutos.

- Exposição oral: lavar a boca cuidadosamente com água.
- Nunca administrar substâncias por via oral em indivíduos inconscientes.
- Não provocar o vômito.
- Em caso de ingestão, buscar imediatamente aconselhamento médico, tendo à mão a embalagem ou rótulo.
- Em caso de ingestão por animal doméstico, procurar um veterinário.
- Os locais tratados devem ser identificados com as seguintes informações: "não mover ou abrir"; "contém rodenticida"; «identificação do produto», "substância ativa" e "em caso de incidente, ligar para o Centro de Informação Anti Venenos 808 250 143.
- Se for aplicada espuma próximo a sistemas de escoamento de água, certificar-se de que não seja possível o contacto entre a espuma e a água.

Eliminação Segura do produto e da sua embalagem:

- Após a conclusão do tratamento, eliminar a espuma ainda presente e a embalagem, de acordo com as normas nacionais.
- Caso seja necessário eliminar restos de espuma, evitar o contato com os olhos.

Armazenamento:

Armazenar em local seco, fresco e bem arejado. Manter a embalagem fechada e não diretamente exposta ao sol. Conservar o produto em local inacessível para crianças, pássaros, animais domésticos e animais de criação.

Manter afastado de bebidas, alimentos e rações.



Rodenticida

- ✓ **Rodenticida de contacto contra ratas y ratones**
(*Rattus norvegicus* y *Mus musculus*)
- ✓ **Rodenticida de contacto pronto a usar, contra ratas e ratos domésticos**
(*Rattus norvegicus* e *Mus musculus*)

Espuma en aerosol (AE)

Composición: Cumatetralilo 0,4062 %, Isotridecanol etoxilado 1,8%

Registro en el R.O.B. n° ES/MR(NA)-2018-14-00358

USO PROFESIONAL ESPECIALIZADO

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Espuma aerosol (formulação de contato pronta para o uso) contendo 0,4062% (p/p) cumatetralilo

Contém: Isotridecanol etoxilado

Autorização de venda n° PT/DGS ARMPB-ml-17/2018 concedida pela DGS

USO PROFISSIONAL

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS




500 ml e

(450 g de solución y
41 g de propelente)

envu

Contacto e ingestión
Contacto e ingestão



ES

PELIGRO

Racumin® Foam

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta. Puede provocar irritación ocular grave. Puede dañar al feto. Puede provocar daños en los órganos (sangre), tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Solicitar instrucciones especiales de uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. No respirar los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. Guardar bajo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimine el contenido y/o su recipiente, así como los roedores muertos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

PT

PERIGO

Racumin® Foam

Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Provoca irritação ocular grave. Pode afetar o nascituro. Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Pedir instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Usar luvas de protecção/roupa de protecção ocular/protecção facial. Não respirar os aerossóis. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Continue a enxaguar. Recolher o produto derramado. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Evitar a libertação para o meio ambiente. Armazenar em local fechado à chave. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar o conteúdo/recipiente em local adequado à recolha de resíduos perigosos. Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos - CIAV - Tel.: 800 250 250



Registrado y distribuido por:

2022 Environmental Science FR S.A.S.
3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON
800 166071

Lote y fecha de fabricación: ver envase
Fecha de caducidad: 4 años después de la fecha de fabricación.

Racumin es un marca registrada de Envu

Bitrex es una marca registrada de MacFarlan Smith, Edinburgh

Registrado por

Bayer CropScience (Portugal)

Produtos para a Agricultura, Lda.

R. Quinta do Pinheiro, 5 - 2794-003 CARNAXIDE

Distribuido por:

2022 Environmental Science FR S.A.S.

3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON

800 166071

Lote e data de fabrico - marcados na embalagem.

Prazo de validade - 4 anos após a data de fabrico.

Racumin é uma marca registrada da Envu

Bitrex é uma marca registrada de MacFarlan Smith, Edinburgh



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado. As águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Ed.1121 - POS86239337H - ARTICLE 84079243

UFI: R3J0-W041-K00G-FU17

650